

# Módulo de Elementos básicos de geometria plana

## Conceitos Geométricos Básicos

Oitavo Ano




## 1 Exercícios Introdutórios

**Exercício 1.** Dados quatro pontos distintos  $A, B, C$  e  $D$ , todos sobre uma mesma reta como indica a figura abaixo, determine o número de segmentos distintos que podem ser formados com vértices em tais pontos.



**Exercício 2.** Usando o compasso, determine na figura abaixo quais segmentos são congruentes.



**Exercício 3.** Determine o único item verdadeiro.



- Se dois segmentos são consecutivos, então eles são colineares.
- Se dois segmentos são adjacentes, então eles são consecutivos.
- Se dois segmentos são congruentes, então eles são colineares.
- Se dois segmentos são colineares, então eles são consecutivos.
- Dois segmentos consecutivos e congruentes sempre são colineares.

**Exercício 4.** Sabendo que o segmento  $AB$  mede  $20\text{cm}$ , determine o comprimento do segmento  $AC$  nos seguintes casos:



- Quando  $CB = 8\text{cm}$ .
- Quando  $AC - CB = 1\text{cm}$ .
- Se  $AC = 2x$  e  $CB = x - 1$ .

**Exercício 5.** Abaixo estão representados cinco pontos distintos sobre uma mesma reta. Quantas semirretas possuem origem em algum desses cinco pontos e não contêm o vértice  $B$ ?




**Exercício 6.** Seja  $M$  o ponto médio de  $AB$ . Se  $AM = 2x - 5$  e  $MB = x + 7$ , encontre o valor de  $x$ .

**Exercício 7.** Os pontos  $A, B$  e  $P$  são distintos e estão sobre uma mesma reta com  $A$  situado à esquerda de  $B$ . Se  $PA > AB$  e  $PB < AB$ , o que podemos dizer sobre a ordem dos três pontos na reta?

**Exercício 8.** Existem quatro pontos consecutivos  $A, B, C$  e  $D$  sobre uma reta. Se  $AD = 2BC$  e  $AB + CD = 20$ , determine o valor de  $AD$ .

## 2 Exercícios de Fixação

**Exercício 9.** Seja  $M$  o ponto médio de  $AB$ . Se  $AM = 7x - 1$  e  $MB = x + 11$ , encontre o valor de  $x$ .




**Exercício 10.** No desenho abaixo,  $M$  é o ponto médio de  $AB$ . Se  $AM = x$ ,  $BC = x - 1$  e  $AC = 4x - 9$ , determine o comprimento de  $AB$ .




**Exercício 11.** Os pontos  $A, B$  e  $C$  são colineares com  $AB = 30\text{cm}$  e  $BC = 10\text{cm}$ . Determine os possíveis valores de  $AC$ .

**Exercício 12.** Dados quatro pontos consecutivos  $A, B, C$  e  $D$  sobre uma mesma reta tais que  $AB \cdot BD = AC \cdot CD$ . Se  $AB = 9\text{cm}$ , encontre o valor de  $CD$ .

**Exercício 13.** No desenho abaixo,  $M$  é o ponto médio do segmento  $AB$ . Se  $DB - DA = 10\text{cm}$ , determine o comprimento de  $DM$ .



**Exercício 14.** No desenho abaixo,  $C$  é o ponto médio de  $AB$  e  $E$  é o ponto médio de  $CD$ . Sabendo que  $AB + ED - AC = 30\text{cm}$ , determine o comprimento de  $AE$ .



**Exercício 15.** Em uma reta se encontram os quatro pontos consecutivos  $A, B, C$  e  $D$  com  $AB = AC - 3$ ,  $AB + CD = 4$  e que satisfazem a seguinte relação:

$$3AB - BD - 2CD = 3.$$

Determine o valor de  $AD$ .

**Exercício 16.** Os pontos  $A, B, C$  e  $D$  estão sobre uma mesma reta e são consecutivos. Sabendo que  $BC = CD$  e que  $AC \cdot BC = 40$ , determine o valor de  $AD^2 - AB^2$ .

### 3 Exercícios de Aprofundamento e de Exames

**Exercício 17.** *Sejam  $M$  e  $N$  os pontos médios, respectivamente, dos segmentos  $AB$  e  $BC$ , contidos numa mesma reta de modo que  $AB = BC$ , com  $A \neq C$ . É sempre verdade que  $MN$  é congruente a  $AB$ ? Justifique.*

**Exercício 18.** *João deseja construir um circuito para o seu trem de brinquedo usando trilhos no formato de segmentos de reta de comprimento fixo. Na interseção de dois trilhos, ele precisa colocar uma peça para que o trem mude sua direção. É possível João construir um circuito fechado com exatamente 10 peças de mudança e de forma que cada trilho possua exatamente 4 tais peças?*

**Exercício 19.** a) *São dados 3 pontos escolhidos sobre a reta suporte de  $AB$ , todos fora do segmento de reta  $AB$ . É possível que a soma das distâncias desses pontos ao vértice  $A$  seja igual à soma das distâncias desses pontos ao vértice  $B$ ?*

b) *Se fossem 1001 pontos ao invés de três, seria possível que a soma das distâncias desses pontos ao vértice  $A$  fosse igual à soma das distâncias desses pontos ao vértice  $B$ ?*

**Exercício 20.** *Em um tabuleiro  $5 \times 5$ , João deve desenhar segmentos de reta ligando vértices opostos dos quadrados  $1 \times 1$  de modo que quaisquer dois segmentos desenhados não possuam pontos em comum (incluindo seus vértices). Qual o número máximo de tais segmentos que podem ser desenhados por João?*

**Exercício 21.** a) *Em quantas partes distintas três retas dividem um plano se não existem duas delas paralelas e também não existem três coincidentes?*

b) *Em quantas partes distintas cinco retas dividem um plano se não existem duas delas paralelas e também não existem três coincidentes?*

*Você conseguiria estipular uma fórmula geral para o mesmo problema envolvendo  $n$  retas?*

## 1 Exercícios Introdutórios

1. Existem 6 segmentos de reta com vértices nesses 4 pontos:  $AB$ ,  $AC$ ,  $AD$ ,  $BC$ ,  $BD$  e  $CD$ . Veja que a resposta não seria diferente se os pontos não fossem colineares.

2. Temos  $IJ = KL$ ,  $GH = FE$  e  $AB = CD$ .

3. Resposta B.

4. a) Como  $AC + CB = 20\text{cm}$ , se  $CB = 8\text{cm}$  temos  $AC = 12\text{cm}$ .

b) Somando  $AC + CB = 20\text{cm}$  com  $AC - CB = 1\text{cm}$ , temos  $2AC = 21\text{cm}$ . Portanto,  $AC = \frac{21}{2}$ .

c) Temos  $20 = AC + CB = 2x + (x - 1)$ . Portanto,  $x = 7$  e  $AC = 2x = 14$ .

5. Com a exceção do ponto B, por qualquer um dos outros pontos, existe exatamente uma semirreta que satisfaz a condição do enunciado. Portanto, existem 4 semirretas.

6. Como  $AM = MB$ , temos  $2x - 5 = x + 7$ , ou seja,  $x = 2x - x = 7 + 5 = 12$ .

7. Se o ponto P se encontra à esquerda de A, o segmento PB é a soma de PA e AB e conseqüentemente maior que AB. Se o ponto P se encontra entre A e B, o comprimento de PA é estritamente menor que o comprimento de AB. Conseqüentemente, a única possibilidade é P estar situado à direita de B. O exemplo abaixo mostra que tal configuração é admissível.



8. Sejam  $AB = x$  e  $CD = y$ . Como

$$2BC = AD = AB + BC + CD = 20 + BC,$$

temos  $BC = 20$  e conseqüentemente  $AD = 40$ .

## 2 Exercícios de Fixação

9. Como  $AM = MB$ , temos  $7x - 1 = x + 11$ , ou seja,  $6x = 12$  e conseqüentemente  $x = 2$ .


10. Como  $AM = MB$ , temos  $AB = 2x$ . Conseqüentemente:

$$4x - 9 = AC = AB + BC = 2x + x - 1.$$

Isso produz:  $x = 9 - 1 = 8$ . Portanto,  $AB = 2x = 16$ .

11. Não podemos ter o vértice A entre B e C pois  $BC < AB$ . Assim, A está situado à esquerda ou à direita do segmento BC. Quando A está mais próximo de C, o segmento AC mede  $AB - BC = 20\text{cm}$ . Quando A está mais próximo de B, o segmento AC mede  $AB + BC = 40\text{cm}$ .

12. Considere o desenho abaixo:



Sejam  $BC = a$  e  $CD = x$ . Assim,

$$AB \cdot BD = AC \cdot CD$$

$$9(a + x) = (9 + a)x$$

$$9a + 9x = 9x + ax$$

$$9a = ax$$

$$9 = x.$$

Portanto, o comprimento de CD é 9cm.

13. Sejam  $AM = MB = x$  e  $DM = y$ . Temos:

$$10 = DB - DA$$

$$= (x + y) - (x - y)$$

$$= 2y.$$

Portanto,  $y = 5\text{cm}$ .

14. Sejam  $AC = CB = x$  e  $AE = y$ . Então  $CE = ED = y - x$  e


$$30 = AB + ED - AC$$

$$= (2x) + (y - x) - (x)$$

$$= y$$

Portanto,  $AE = 30\text{cm}$ .

15. Considere o desenho abaixo:



Sejam  $AB = x$ ,  $BC = y$  e  $CD = z$ . Temos  $y = AC - AB = 3$ . Além disso,

$$3 = 3AB - BD - 2CD$$

$$= 3x - (3 + z) - 2z$$

$$= 3x - 3z - 3 \Rightarrow$$

$$6 = 3x - 3z.$$

Também temos  $12 = 3AB + 3CD = 3x + 3z$ . Somando com a última equação, obtemos  $18 = 6x$ . Portanto,  $x = 3$  e  $z = 4 - 3 = 1$ . Finalmente,  $AD = AB + BC + CD = 3 + 3 + 1 = 7$ .

16. Sejam  $AB = x$  e  $BC = CD = y$ . Assim,


$$\begin{aligned} AD^2 - AB^2 &= (AD - AB)(AD + AB) \\ &= (2y)(2x + 2y) \\ &= 4y(x + y) \\ &= 4BC \cdot AC \\ &= 160. \end{aligned}$$

### 3 Exercícios de Aprofundamento e de Exames

17. Sim. Veja que:

$$\begin{aligned} MN &= MB + NB \\ &= \frac{AB}{2} + \frac{BC}{2} \\ &= \frac{AB}{2} + \frac{AB}{2} \\ &= AB. \end{aligned}$$

18. Sim, é possível. No exemplo abaixo, os pontos pretos simbolizam as estações e os segmentos, os trilhos.



19. a) Se todos os três pontos estão ambos à esquerda de  $A$  ou ambos à direita de  $B$ , a soma das distâncias dos três pontos a um desses vértices é estritamente maior do que a soma das distâncias ao outro vértice. Precisamos realmente estudar o caso em que existem dois deles de um lado e um do outro como indica a figura. Calculemos a diferença entre a soma das distâncias ao vértice  $A$  e a soma das distâncias ao vértice  $B$ .




$$\begin{aligned} (XA + YA + ZA) - (XB + YB + ZB) &= \\ (XA - XB) + (YA - YB) + (ZA - ZB) &= \\ (-AB) + (-AB) + (AB) &= \\ -AB &\neq 0. \end{aligned}$$


b) Sejam  $S_A$  e  $S_B$  as somas das distâncias de todos os pontos ao vértice  $A$  e ao vértice  $B$ , respectivamente. Analisemos a contribuição de um ponto  $X$  na diferença  $S_A - S_B$ . Quando  $X$  está à esquerda de  $A$ , a contribuição é  $XA - XB = -AB$  e quando  $X$  está à direita

de  $B$  a contribuição é  $XA - XB = AB$ . Ou seja, alguns pontos vão contribuir com o valor  $+AB$  e outros com o valor  $-AB$ . Para que a diferença seja zero, a quantidade de parcelas com o sinal “+” deve ser igual à quantidade de parcelas com o sinal “-”. Como 1001 é um número ímpar, tal igualdade não pode ocorrer.


20. (Extraído do Torneio das Cidades) Os 25 quadrados determinam  $6 \times 6 = 36$  vértices. Como cada segmento deve usar dois deles, podemos concluir inicialmente que João não pode desenhar mais que  $\frac{36}{2} = 18$  segmentos. Analisando um lado qualquer do quadrado maior, não é possível que os 6 vértices sejam usados. Assim, eliminando-se um vértice do lado superior e um vértice do lado inferior, teremos apenas 34 vértices utilizáveis e conseqüentemente não mais que  $\frac{34}{2} = 17$  segmentos. Essa ainda não é a melhor estimativa. Para que apenas dois vértices dos lados mencionados anteriormente não sejam usados, deve ocorrer a configuração exibida na próxima figura:




Note que não é possível desenhar segmentos usando os vértices do lado inferior sem deixar de usar pelo menos mais um vértice de tal lado. Logo, não poderemos usar pelo menos 3 vértices. Como o número de vértices usados deve ser um número par, no máximo utilizaremos 32 deles e assim teremos não mais que  $\frac{32}{2} = 16$  segmentos desenhados. O exemplo abaixo mostra que tal número é realizável.



21. a) Para três retas, temos 7 regiões como indica a próxima figura.



b) Para cinco retas, temos 16 regiões. Analisando a configuração com três retas, podemos notar que a quarta reta cria 4 novas regiões ao intersectar as retas que já estavam traçadas. A quinta reta gera mais 5 regiões ao intersectar as outras quatro.



Como não existem duas retas paralelas e nem três concorrentes, se já estão traçadas  $k$  retas, uma nova reta acrescentaria mais  $k+1$  regiões porque ela dividirá em duas  $k+1$  regiões que já existiam. Assim,  $n+1$  retas obedecendo as condições do enunciado dividem o plano em:

$$1 + (1 + 2 + \dots + n) = 1 + \frac{n(n+1)}{2}.$$